

FOLLETO MEDICO
ADOLEXMED-CELL
Comprimidos de disolución bucal

DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL

Nº REF.:

34982/05

02 ENE 2006

UNIDAD DE MODIFICACIONES

FORMULA.

Cada comprimido de disolución bucal contiene:

Cetilpiridinio cloruro 2,5 mg

Alantoina 10,0 mg

Excipientes: Aspartamo, polividona, manitol, lactosa monohidrato, mentol, esencia de eucaliptos, colorante FD y C azul N° 2 y estearato de magnesio.

ACCIONES.

Cloruro de Cetilpiridinio es un antiséptico clasificado dentro de los agentes tensioactivos catiónicos. Su estructura química corresponde a una base de amonio cuaternario. Tiene poder lítico y solvente sobre la membrana de la bacteria. A baja concentración actúa como bactericida para una gran variedad de bacterias grampositivas, gramnegativas y algunos hongos.

Los agentes catiónicos como Cetilpiridinio tienen las siguientes ventajas como antisépticos:

- A la concentración eficaz son poco irritantes para los tejidos.
- Su acción se inicia rápidamente porque mojan y penetran con facilidad los tejidos.
- Poseen acción detergente, queratolítica y emulsionante.

La Alantoina se combina con un antiséptico con el objeto de ayudar a la reparación de los tejidos dañados por las infecciones, ya que se ha visto que favorece la recuperación de heridas supurantes, úlceras, aftas e infecciones dermatológicas.

INDICACIONES.

Está indicado como antiséptico y germicida bucofaringeo. Coadyuvante en el tratamiento en procesos infecciosos de la boca, faringe y amígdalas.

CONTRAINDICACIONES.

Está contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto.

REACCIONES ADVERSAS.

En muy raras ocasiones puede producir reacciones de tipo alérgicas como ardor y prurito. Por ingesta accidental masiva puede presentarse síntomas digestivos y neurológicos tales como náuseas, vómitos, diarreas y debilidad muscular.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL

INTERACCIONES.

Los amonios cuaternarios son incompatibles con la fluoreceína, los nitratos de pilocarpina, sales de plata, ácido bórico y los salicilatos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Este medicamento puede aliviar los síntomas de la faringoamigdalitis estreptocócica, pero no previene sus complicaciones. No se recomienda su uso en embarazo, lactancia y niños menores de 3 años.

Este medicamento contiene manitol, puede provocar diarrea.

VIA DE ADMINISTRACION Y DOSIFICACION.

Vía de administración: Oral

Modo de uso: Deje disolver en la boca 1 comprimido cada 2 horas.

BIBLIOGRAFIA.

- P.R. Vademecum, 1999
- Drug Information, 1996
- Index Merck, 1996.

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL**