



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE  
DIVISIÓN PHARMA

**QUASSIA  
CHAMPÚ AL 4% p/p**

Fecha de edición: 05-2007  
V: 01  
Página : 1 / 3

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o **al químico** farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

### Composición y presentación.

Cada 100 g de champú contiene:

Extracto líquido de corteza de Quassia amara L. 4,0 g  
(Equivalente a no menos de 8,0 mg de quassina)

Excipientes: Laurilsulfato de trietanolamina, laurileter sulfato de sodio, cocoamidopropilbetaina, dietanolamina de ácido graso de coco, cloruro de sodio, ácido acético, agua, fragancia.

Frasco con x ml de shampoo.

### Clasificación.

Pediculicida.

### Vía de administración.

Tópica. Sólo para uso externo, exclusivamente sobre el cabello y cuero cabelludo.

### Pediculosis.

La pediculosis del cuero cabelludo es una enfermedad causada por un parásito (pediculus humanus capitis). La pediculosis puede afectar la cabeza (incluyendo cejas y barba), el cuerpo o la zona genital (ladillas). La pediculosis no tratada puede provocar dermatitis (irritación a la piel) y posteriormente una infección secundaria.

### Indicaciones.

Tradicionalmente utilizada para prevenir y tratar las infecciones con pediculus humanus, variedad capitis (piojos de la cabeza) y sus huevos (liendres).

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PACIENTE

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL SUBDEPTO. REGISTRO UNIDAD PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES
19 NOV 2007
Nº Ref: 690310+
Nº Registro: N-649510+
Firma Profesional:



**QUASSIA  
CHAMPÚ AL 4% p/p**

Fecha de edición: 05-2007  
V: 01  
Página : 2/ 3

**Contraindicaciones.**

No administrar en caso de: alergia conocida a Quassia o alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia. Niños menores de 4 años. Presentar heridas o inflamación en el cuero cabelludo.

**Advertencias y precauciones.**

No utilice este medicamento en dosis mayores o por más tiempo que el recomendado. Evite el contacto de estos productos con los ojos y mucosas (bucal, nasal, vaginal, etc). Si esto sucede enjuague con abundante agua tibia.

El tratamiento debe realizarse a todo el grupo familiar, aunque algunos miembros aparentemente no estén infectados.

Se recomienda hervir la vestimenta y ropa de cama o planchar si no puede hervirse. No lo aplique sobre las cejas y las pestañas.

Mantener este producto estrictamente fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de ingestión accidental acudir a un servicio médico de urgencia.

Mantener en un lugar fresco, a no más de 25° C.

Si aparecen síntomas de reacción alérgica al medicamento (prurito, eritema, edema) o síntomas de irritación, es necesario suspender el tratamiento y acudir a un médico.

Embarazadas y madres en período de lactancia: Use con precaución y con consejo médico.

**Interacciones.**

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones), por lo que no es conveniente la aplicación de este producto junto a otras lociones o cremas o con medicamentos.

No se han detectado interacciones con este medicamento.

**Efectos adversos (no deseados).**

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Por ser un producto de aplicación tópica, puede presentarse en la piel una reacción de hipersensibilidad que se caracteriza por eritema, prurito, enrojecimiento de la piel, etc.

Si usted presenta alguno de los síntomas anteriores, mientras está en tratamiento con este producto, suspenda su aplicación y acuda al médico.

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PACIENTE



**QUASSIA  
CHAMPÚ AL 4% p/p**

Fecha de edición: 05-2007  
V: 01  
Página : 3/ 3

**Modo de empleo.**

Tratamiento: Lave el cabello por una vez con este shampoo y repita una semana más tarde, para asegurarse de la eliminación total de piojos y liendres.

Prevención: Lavar el cabello una vez a la semana con este shampoo, para evitar nuevas infestaciones.

Modo de aplicación: Humedecer el cabello y aplicar suficiente cantidad de shampoo sobre el cabello y el cuero cabelludo, friccionando ligeramente, prestando atención a la zona posterior de la cabeza y cercana a la orejas. Durante el friccionamiento los ojos se deben mantener cerrados y bien tapados en los niños, para evitar que entren en contacto con el preparado. Dejar en contacto durante 10 minutos, desenrede el cabello con un peine especial y a continuación enjuague con agua tibia. Secar el cabello y remover los parásitos y liendres con el peine fino. No lavarse la cabeza con shampoo cosmético hasta 24 horas después de la aplicación de este producto para no anular su efecto residual.

Como prevención, repetir el tratamiento a los 7 días.

**Condiciones de almacenamiento.**

Mantener lejos del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor (a monos de 25° C), luz y humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Medidas de prevención.**

Con el objeto de evitar la aparición de la pediculosis (piojos) o su reinfestación es fundamental que usted y su grupo familiar respeten las siguientes recomendaciones:

Evitar el contacto físico con personas infestadas.

Mantener el pelo amarrado o recogido.

Lavar frecuentemente el cabello (mínimo 2 veces por semana); ojalá mantenerlo corto y usar un peine de dientes finos.

Evitar el intercambio o uso de gorros, peinetas, cepillos, colet y otros, por el riesgo de pertenecer a personas infestadas, especialmente en colegios.

Lavar frecuentemente los utensilios personales, especialmente si se ha diagnosticado pediculosis. El lavado puede hacerse con agua caliente o fría.

Ventilar diariamente las habitaciones, aselear frazadas, cobertores y similares. Lavar con frecuencia las sábanas, toallas y ropa de dormir.

Revisar habitualmente el cabello (una vez a la semana) de los miembros del grupo familiar que se encuentren en mayor riesgo de contagio (niños en edad preescolar y escolar).

Elaborado y envasado para MED-CELL S.A., Caupolicán 9261 A-B, Quilicura, Santiago, por Laboratorio Valma Ltda., Miguel de Atero 2883, Santiago.  
Distribuido por MED-CELL S.A. Fono: 443.54.10

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PACIENTE