

BROPAVOL

JARABE 8 mg/5 mL

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Bromhexina Clorhidrato	8.0 mg
Excipientes: Los aprobados en registro.	

INDICACIONES

Expectorante y mucolítico de las secreciones bronquiales.

Indicado para el alivio de la tos producida por estados gripales. No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica o causada por el cigarrillo, asma, enfisema o en tos seca.

CONTRAINDICACIONES

No debe administrarse a pacientes con sensibilidad conocida a la Bromhexina u otros componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA

- **Embarazo:** Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.
- **Lactancia:** Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

EFECTOS ADVERSOS (no deseados)

Por regla general, la Bromhexina se tolera bien. Se ha informado sobre efectos secundarios gastrointestinales leves. En raros casos pueden presentarse reacciones alérgicas, incluyendo rashes cutáneos, broncoespasmo, angioedema y anafilaxis.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Es preciso advertir a los pacientes que durante el tratamiento es de esperar aumento de la secreción, lo que puede ser indeseable en pacientes incapaces de expectorar.

Debe usarse con precaución en personas que tengan úlcera gastroduodenal o con antecedentes ulcerosos.

- **Lactantes y niños:** El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

“Este jarabe contiene azúcar, precaución en diabéticos”

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

No se aconseja la asociación de mucolíticos antitusivos con sustancias que provoquen sequedad de mucosas (atropínicos).

SOBREDOSIFICACIÓN

Aún no se han reportado con esta asociación, casos de sobredosis no tratada. Debido a una sobredosificación o intoxicación accidental podrían llegar a presentarse síntomas tales como mareos, vómitos y dolor abdominal.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con un Centro Toxicológico.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía de Administración: Oral

La dosis y período de tratamiento debe ser indicado por el médico en su caso particular, pero en general la dosis recomendada es:

Jarabe (8mg/5 mL):

- Adultos y niños mayores de 12 años: 1 cucharadita (5 mL) 3 veces al día.
- Niños de 6 a 12 años: ½ cucharadita (2,5mL) 3 veces al día.

Al comienzo del tratamiento pudiera requerirse un aumento de la dosis, ésta se puede elevar hasta alcanzar una dosis total diaria de 48 mg en los adultos.

Nota: Agitar antes de usar.

"Si el síntoma (tos) persiste por más de 5 días o empeora consulte a su médico"

ALMACENAMIENTO

Mantenga en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C. Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL de Bropavol jarabe.