

GINNA
CREMA VAGINAL 2%
(Fenticonazol)

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada 100 g de crema contiene:	
Nitrato de Fenticonazol	2,00 g
Excipientes: Los aprobados en registro.	

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Antifúngicos tópicos: Derivados imidazólicos y triazólicos.

El nitrato de fenticonazol es un antifúngico indicado para el tratamiento de infecciones vaginales por hongos.

Ginna se indica para el tratamiento de candidiasis de la mucosa vaginal (vulvovaginitis, vaginitis y leucorrea).

CONTRAINDICACIONES

No use Ginna crema si es alérgico al principio activo, a otros derivados imidazólicos o a alguno de los demás componentes de este medicamento.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA

Aunque la absorción vaginal del nitrato de fenticonazol sea muy baja, no se recomienda la utilización del producto durante el embarazo y lactancia.

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados)

Tras la aplicación de Ginna puede ocurrir un ardor leve, que deberá desaparecer rápidamente. Ginna generalmente no irrita la piel y mucosas.

Informe a su médico ante la aparición de reacciones desagradables, como, por ejemplo, ardor y picazón persistentes.

El nitrato de fenticonazol generalmente es bien tolerado tanto en la piel como en la mucosa. Reacciones eritematosas leves y transitorias o sensación de ardor han sido raramente reportadas y normalmente desaparecen con rapidez. En caso de reacciones de hipersensibilidad o desarrollo de resistencia a los microorganismos, el tratamiento debe ser suspendido.



Cuando se utiliza según las instrucciones, el nitrato de fenticonazol se absorbe muy poco y por lo tanto se excluyen efectos adversos sistémicos.

Sólo excepcionalmente se han observado reacciones eritematosas (enrojecimiento) suaves y transitorias.

En caso de aparición de una irritación persistente, reacciones de hipersensibilidad (reacciones alérgicas) o desarrollo de organismos resistentes, se aconseja interrumpir el tratamiento y consultar al médico. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Ginna crema.

Ginna no debe utilizarse en caso de alergia conocida al nitrato de fenticonazol o a los componentes del producto. Se recomienda no utilizar el producto durante el período menstrual.

En el momento de la aplicación en la lesión o de la inserción intravaginal, puede ocurrir una ligera sensación de ardor que desaparece rápidamente.

La utilización de productos para aplicación tópica, especialmente por tiempo prolongado, puede causar sensibilización. En ese caso, se debe suspender el tratamiento para establecer un tratamiento conveniente.

Evite el contacto con los ojos. No utilice vendajes oclusivos o que no dejen transpirar, pues podrían favorecer el desarrollo de levaduras, con la consiguiente irritación cutánea.

Las mujeres embarazadas no deben utilizar aplicador sin orientación médica.

NO APLIQUE ESTE MEDICAMENTO SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU MÉDICO, PUEDE SER PELIGROSO PARA LA SALUD.

INTERACCIONES

Informe a su médico sobre cualquier medicamento que está tomando, ya sea con o sin receta.

Usted debe consultar con el médico o farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

No se han descrito interacciones con el uso de este medicamento.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

Ginna debe utilizarse por 7 días consecutivos y aplicarse al acostarse en la noche. La crema debe introducirse en la vagina con el aplicador lleno (5g de crema). Se debe utilizar un aplicador por cada aplicación, el cual debe ser descartado tras el uso.

Para evitar una reinfección, la pareja también debe tratarse bajo orientación médica específica.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:


Lavarse bien las manos antes y después de las aplicaciones con Ginna. Todas las aplicaciones deben realizarse de noche, antes de acostarse. Ginna debe ser utilizado solo con el aplicador que acompaña el producto, para administración vaginal. La crema debe introducirse en la vagina con el aplicador lleno (5g de crema). Se debe utilizar un aplicador por día, el cual debe ser descartado tras el uso.

- Siga las instrucciones ilustradas en los siguientes diagramas.
- Asegúrese que el aplicador esté perfectamente limpio.


1. Retire la tapa del pomo, inviértala y utilice la punta para abrir el pomo. Acople el extremo del aplicador en el extremo abierto del pomo.

Apriete el pomo suavemente desde la base (fondo), para que el aplicador se rellene. En caso de que exista alguna resistencia del émbolo, tírelo delicadamente.

El aplicador debe rellenarse por completo



2. Desacople el aplicador del pomo, que debe cerrarse inmediatamente con la tapa.



3. Acostada, con las piernas flexionadas y separadas, introduzca delicadamente el aplicador profundamente en la vagina y pulse el émbolo completamente. Después retire el aplicador sin tocar el émbolo.



4. Descartar el aplicador



No interrumpa el tratamiento sin el conocimiento de su médico. Solamente él podrá evaluar la evolución de su tratamiento y decidir cuándo y cómo éste debe ser interrumpido.

SOBREDOSIFICACIÓN

Hasta el momento no se han observado casos de sobredosis con el producto, pues el nitrato de fenticonazol es muy poco absorbido, cuando se utiliza según instrucciones.

Si se producen efectos secundarios sistémicos a consecuencia de empleo inadecuado de este producto o de una sobredosificación accidental, se debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento.

ALMACENAMIENTO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en su envase original, en lugar a no más de 30 °C. Proteger de la luz, calor y humedad.

PRESENTACIÓN

Estuche con 1 Pomo de Ginna Crema Vaginal 2%.