

PASTA LASSAR

Pomada

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada 100 g de pomada contiene:	
Oxido de Zinc	25,0 g
Excipientes: Los aprobados en registro.	

INDICACIONES.

Cicatrizante dérmico. Útil en irritaciones de la piel por coceduras en lactantes, grietas en tejidos dañados por quemaduras, o afecciones dermatológicas.

CONTRAINDICACIONES.

No use este producto si es alérgico al Oxido de Zinc o a alguno de sus componentes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

No ingerir. En caso de ingestión accidental acudir al centro asistencial más próximo.
Evitar contacto con los ojos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

El efecto de un medicamento puede ser modificado por su administración junto con otros (interacción), por esto, Ud. debe comunicar al médico o al farmacéutico todos los medicamentos que está usando.

REACCIONES ADVERSAS (no deseados).

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener.

Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados, especialmente si se usan por un período prolongado de tiempo o en grandes dosis.

Si aparecen algunos de los siguientes síntomas deje de usar el medicamento y consulte al médico:

Irritación de la piel, descamación, enrojecimiento, hinchazón o si se agravaran los síntomas iniciales.

Si Ud. nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte a su médico.

SOBREDOSIFICACIÓN.

A dosis terapéuticas indicadas, no presenta ninguna toxicidad.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN.

Uso Externo.

Lavar cuidadosamente la zona afectada y cubrir con una cantidad adecuada de Pasta Lassar 2 a 4 veces al día.

ALMACENAMIENTO.

Mantener lejos del alcance de los niños.

Conservar en su envase original, a no más de 25° C, protegido del calor, luz y humedad.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

PRESENTACIÓN.

Envase conteniendo X g de Pasta Lassar.