

Comprimidos Disolución Bucal**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido de disolución bucal contiene:

Cloruro de Cetilpiridinio 2,5 mg

Alantoína 10,0 mg

Noscapina 10,0 mg

Excipientes: Aspartamo (5 mg), povidona K-90, manitol, lactosa monohidrato, mentol, esencia de eucaliptus polvo, colorante FD&C amarillo N° 5, colorante FD&C azul N° 2, estearato de magnesio.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

CLASIFICACIÓN:

Antiséptico bucofaríngeo, antitusivo.

INDICACIONES:

Coadyuvante en el tratamiento sintomático de las molestias producidas por infecciones bucofaríngeas asociadas a tos irritativa no productiva.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Las amigdalitis y otras infecciones pueden causar graves problemas a largo y mediano plazo si no son tratadas con los medicamentos adecuados y a través de un diagnóstico médico. Este medicamento puede aliviar el dolor de garganta y otros problemas asociados a este tipo de enfermedades, pero no cura ni previene sus complicaciones.

Embarazo: No usar, salvo indicación médica.

Lactancia: No usar, salvo indicación médica.

Niños: No usar en menores de 12 años, salvo indicación médica.

Ancianos: Ud. debe informar a su médico o farmacéutico respecto de las enfermedades que tiene o los medicamentos que usa.

Otras: Acuda a su médico o farmacéutico ante cualquier duda respecto a la administración, efectos, riesgos o cualquier otro aspecto que Ud. considere importante aclarar o mencionar, antes del uso del medicamento.

Si después de 3 días de uso los síntomas persisten o empeoran debe consultar al médico.

Este medicamento contiene aspartamo, precaución en pacientes fenilcetonúricos.

INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede ser modificado por su administración junto con otros (interacción). Es muy importante que consulte con el médico o farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento si está tomando otros. Si va al médico, no olvide mencionar que está tomando este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS:

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados, especialmente si se toman por período de tiempo prolongado y/o en grandes dosis. Si aparece cualquiera de los síntomas siguientes deje de tomar el medicamento y consulte al médico: mareos, náuseas o vómitos, problemas respiratorios.

Otros efectos indeseables pero son pasajeros y normalmente no requieren atención médica: molestias gástricas.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Deje disolver en la boca 1 comprimido cada 3 a 4 horas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantenga fuera del alcance de los niños y en su envase original, protegido del calor (a no más de 25 °C), luz y humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. No recomiende este medicamento a otra persona.

Fabricado para **Medipharm SpA.**, Calle Volcán Licancabur N°425, Edificio N°2, Pudahuel, Santiago, Chile., por **Eurofarma Chile S.A.**, Camino a Melipilla 7073, Cerrillos, Santiago, Chile.