

REGISTRO PARA INFORMACION
MEDICA
IPOLAR
VENTA AL PUBLICO

PERMETRINA LOCION CREMOSA 1%
FOLLETO DE INFORMACION MEDICA

04 SEP 1990

BICHOL

La permetrina presenta una acción pediculicida y ovidica contra el *Pediculus humanus var. capitis*. La alta proporción de curación (97 - 99%) en pediculosis de la cabeza observada 14 días después de la aplicación única, se atribuye a la combinación de las acciones pediculicida y ovidica y a la persistencia residual de la permetrina en el pelo, que contribuye a prevenir reinfestaciones.

La permetrina actúa sobre la membrana de la célula nerviosa del parásito, interrumpiendo la corriente del canal de sodio que regulariza la polarización de la membrana. El consiguiente atraso en la repolarización es motivo de la parálisis del parásito. Se estima que menos de un 2% de permetrina es absorbida luego de una aplicación única de crema al 1%.

INDICACIONES

- Pediculosis de la cabeza y del cuerpo.

INSTITUTO DE SALUD P. BOLIVIA
Departamento de Control y Vigilancia
Estación Registrada de Farmacología Precoordinada

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad conocida a la permetrina o a otras piretrinas o piretroïdes sintéticos.
- Hipersensibilidad a crisantemos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- En caso de presentarse hipersensibilidad, interrumpir el tratamiento.
- La permetrina puede exacerbar temporalmente el prurito, edema y eritema producido por la pediculosis misma.
- Debe evitarse el contacto con los ojos. De ocurrir, lavarlos de inmediato profusamente con agua.
- Terminada la aplicación, deshacerse de todo resto de crema para prevenir su ingestión.

04 SEP 1990

PROSPECTO INTERNO
FORMA APLICAR EN EL CUERO
DE LA CABEZA

VIA DE ADMINISTRACION Y POSOLOGIA

La Loción de Permetrina se aplica por una sola vez. Menos del 1% de los pacientes requieren tratamiento adicional. Si luego de 7 días se observan piojos puede aplicarse un segundo tratamiento.

Lavar con champú, enjuagar y secar el pelo y el cuero cabelludo. Aplicar la Loción Cremosa de Permetrina mediante un masaje firme. Dejar que la loción permanezca 10 minutos en contacto con el pelo y el cuero cabelludo. Luego enjuagar y secar con una toalla limpia.

Luego del tratamiento permanece en el pelo una cantidad residual de permetrina que confiere protección contra una reinfestación por aproximadamente 2 semanas.

PRESENTACION

Envase con 60 ml. de loción cremosa.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA
Departamento de Control Nacional
Sección Registro de Especialidades Farmacéuticas