

BROPAVOL JARABE 8 mg/5 mL

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**

BROPAVOL JARABE 8 mg/ 5 mL
Bromhexina Clorhidrato

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o **químico farmacéutico**. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada 5 mL de jarabe contiene:

Bromhexina clorhidrato 8 mg

Excipientes: (Metilparabeno, ácido cítrico anhidro, esencia de gustard, azúcar, agua purificada) c.s

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

CLASIFICACIÓN:

Expectorante y mucolítico de las secreciones bronquiales.

INDICACIONES:

“Indicado para el alivio de la tos producida por estados gripales. No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica o causada por el cigarrillo, asma, enfisema o en la tos seca”.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Antes de usar este medicamento deben evaluarse los riesgos y beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre usted y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

Es preciso advertir a los pacientes que durante el tratamiento es de esperar aumento de la secreción, lo que puede ser indeseable en pacientes incapaces de expectorar.

Debe usarse con precaución en personas que tengan úlcera gastroduodenal o con antecedentes ulcerosos.

- **Embarazo:** Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.
- **Lactancia:** Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.
- **Lactantes y niños:** El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

“ Este jarabe contiene azúcar, precaución en diabéticos”

BROPAVOL JARABE 8 mg/5 mL

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**CONTRAINDICACIONES:**

No debe administrarse a pacientes con sensibilidad conocida a la bromhexina u otros componentes de la fórmula.

INTERACCIONES:

No se aconseja la asociación de mucolíticos antitusivos con sustancias que provoquen sequedad de mucosas.

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados):

Por regla general, la bromhexina se tolera bien. Se ha informado sobre efectos secundarios gastrointestinales leves. En raros casos pueden presentarse reacciones alérgicas.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Administración vía oral. La dosis y período de tratamiento debe ser indicado por el médico en su caso particular, pero en general la dosis recomendada es:

Jarabe (8mg/5 mL):

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 cucharadita (5 mL) 3 veces al día.

Niños de 6 a 12 años: ½ cucharadita (2,5mL) 3 veces al día.

Al comienzo del tratamiento pudiera requerirse un aumento de la dosis, ésta se puede elevar hasta alcanzar una dosis total diaria de 48 mg en los adultos.

Nota: Agitar antes de usar.

"Si el síntoma (tos) persiste por más de 5 días o empeora consulte a su médico"

SOBREDOSIS:

Aún no se han reportado con esta asociación, casos de sobredosis no tratada.

Debido a una sobredosificación o intoxicación accidental podrían llegar a presentarse síntomas tales como mareos, vómitos y dolor abdominal. Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro Toxicológico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener en un lugar fresco y seco, a no mas de 25° C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

**NO USAR ESTE PRODUCTO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
INDICADA EN SU ENVASE.**

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES A SU MÉDICO.

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.