


20 OCT 2003

## FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

### Gesiproct Crema



**Vía de administración:** Uso tópico (Anal y rectal)

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

#### Composición:

Cada 100 g de crema contiene:

Tribenósido	5,00 g
Lidocaína clorhidrato	2,00 g
Excipientes	c. s.
Pomo con X g	

**Excipientes:** Aceite mineral, Acido esteárico, Monoestearato de glicerilo, Promulgen D, Miristato de isopropilo, Trietanolamina, Metilparabeno, Propilparabeno, Agua purificada

#### Clasificación:

Antihemorroidal

#### Recomendaciones de uso:

Tratamiento local de hemorroides internos y externos.

FOLLETO DE INFORMACION  
AL PACIENTE

#### Contraindicaciones.

Este medicamento no debe ser usado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad (Alergia) a Tribenósido, Lidocaína o a cualquier otro componente del producto.

#### Precauciones y advertencias:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso. Principalmente se debe considerar los siguientes aspectos:

a) Alergia: Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, antisépticos u otros medicamentos, particularmente otros productos para las hemorroides.

- b) Niños: No hay experiencia clínica con el uso de este producto.
- c) Embarazo: No utilice durante los 3 primeros meses de embarazo. Podría utilizarse desde el cuarto mes de embarazo, pero deberá ser el médico quien determine la administración.
- d) Lactancia: Durante este período debe manejarse con sumo cuidado su uso.
- e) Otros: Si las hemorroides sangran consulte con su médico. Evite el contacto con los ojos.

#### **Interacciones:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). No se ha informado de interacciones con otros medicamentos.

#### **Efectos adversos (no deseados):**

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. También pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso, ellos son: sensación de quemazón (ardor) leve e inflamación local. No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico. Si Ud. nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte con el médico o farmacéutico

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PACIENTE

#### **Presencia de otras enfermedades:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, alguno de ellos severos.  
En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe consultar al médico o farmacéutico antes de administrar este medicamento.

#### **Modo de uso:**

Inicialmente mientras duren las molestias se aplicará la crema 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Más adelante se reducen las aplicaciones a 1 dosis diaria en la noche durante 15 días.

En el caso de hemorroides internas introduzca la cánula (atornillada al pomo) con suavidad en el recto y después presione el pomo para depositar la crema.

**Condiciones de almacenamiento.**

Mantenga fuera del alcance de los niños. Mantenga en su envase original, protegido del calor (a menos de 25° C), luz y humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicado en el envase.

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PACIENTE