

LEVOXIN

Comprimidos Recubiertos 500 mg

BIOEQUIVALENTE

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada comprimido recubierto contiene:	
Levofloxacin (en forma hemihidratada)	500 mg.
Excipientes: Los aprobados en registro	

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

Antibiótico sistémico simple, perteneciente al grupo de las quinolonas

Levofloxacin está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por agentes sensibles al Levofloxacin, tales como:

- Infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, incluido sinusitis aguda, exacerbaciones agudas de bronquitis crónica y neumonía adquirida en la comunidad.
- Infecciones de piel y tejido subcutáneo, tales como impétigo, abscesos, furúnculos, celulitis y erisipela.
- Infecciones del tracto urinario incluyendo pielonefritis.
- Neumonía nosocomial
- Prostatitis

CONTRAINDICACIONES

Levofloxacin está contraindicado en casos de hipersensibilidad conocida a Levofloxacin, a otros agentes antimicrobianos derivados de las quinolonas, o a cualquier componente de la formulación.

También está contraindicado en pacientes con historia de problemas relacionados con la administración de quinolonas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se han relatado convulsiones y psicosis tóxicas en pacientes en tratamiento con derivados quinolónicos, incluyendo Levofloxacino.

Las quinolonas también pueden provocar aumento de la presión intracraneana y estimulación del sistema nervioso central pudiendo desencadenar temores, inquietudes, ansiedad, mareos, confusión, alucinaciones, paranoia, depresión, pesadillas, insomnio y raramente pensamientos suicidas. Estas reacciones pueden ocurrir después de la primera dosis. En casos de aparición de algunas de estas reacciones, el tratamiento se deberá discontinuar y administrar las medidas adecuadas para superar la situación.

En casos de infecciones nosocomiales causadas por pseudomonas aeruginosa puede ser necesaria una terapia combinada y en casos extremadamente graves de neumonía neumocócica el uso de Levofloxacino puede no ser la terapia de primera elección.

Como todas las quinolonas, Levofloxacino debe ser usado con precaución en pacientes con disturbios del sistema nervioso central, sospechosos o confirmados, o casos que poseen una predisposición a convulsiones (ej.: arteriosclerosis cerebral grave, epilepsia) o con presencia de otros factores de riesgo que aumenten la predisposición a convulsiones o disminuyan el umbral de convulsión (ej.: tratamiento con otras drogas, disfunción renal).

- Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.
- No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
- No repita el tratamiento sin indicación médica.
- No recomiende este medicamento a otra persona.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.

-Embarazo: Informe a su médico si está embarazada antes de comenzar el tratamiento con Levofloxacino.

-Lactancia: Informe a su médico si está amamantando.

No se recomienda el uso de Levofloxacino durante el embarazo y la lactancia.

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados).

Informe a su médico si aparece alguna de estas reacciones desagradables con el uso de Levofloxacino: diarrea, náuseas, vómitos.

También pueden ocurrir, aunque menos frecuentemente: flatulencia, dolor abdominal, erupciones cutáneas, picazón, dispepsia, insomnio y mareos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

No se conocen interacciones de este medicamento con alimentos y alcohol. Sin embargo, no se recomienda ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento con Levofloxacino.

Es muy importante que el médico sea informado si el paciente está tomando antiácidos, polivitamínicos o preparaciones que contengan hierro o zinc, ya que pueden interferir con la absorción de Levofloxacino. En caso de que estos medicamentos sean necesarios, ellos deberán tomarse 2 horas antes o después de la administración de Levofloxacino.

Informe a su médico sobre cualquier medicamento que esté tomando, antes del inicio o durante el tratamiento.

Levofloxacino puede provocar mareos u otros efectos colaterales neurológicos que pueden afectar su vigilancia, su habilidad para conducir vehículos u operar máquinas. Por lo tanto, no es aconsejable dirigir vehículos, operar máquinas y ejecutar tareas que pueden ser peligrosas.

Levofloxacino no debe ser usado en niños y adolescentes en fase de crecimiento.

Las dosis recomendadas son válidas también para personas mayores.

No hay necesidad de ajuste de dosis en pacientes con enfermedad renal.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN.

Siga las instrucciones de su médico respetando siempre los horarios, las dosis y la duración del tratamiento.

Normalmente, la dosis oral diaria es de 500 mg. La dosis depende del tipo y de la gravedad de la infección, así como de la sensibilidad de la patógena causal probable. La duración del tratamiento varía de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Al igual que con otros antibióticos, la administración de Levofloxacino deberá continuarse durante un mínimo de 48 a 72 horas después de que el paciente permanezca sin fiebre o se haya conseguido la erradicación bacteriana.

INTERRUPCIÓN DEL TRATAMIENTO.

No interrumpa el tratamiento sin el consentimiento de su médico, ya que solamente él podrá evaluar la eficacia de la terapia.

La interrupción del tratamiento puede ocasionar la no obtención de los resultados esperados.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

SOBREDOSIFICACIÓN.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Conservar el medicamento a temperatura ambiente (entre 15 y 30°C).
Proteger de la luz y humedad excesiva.

PRESENTACIÓN.

Estuche con X Comprimidos Recubiertos de Levoxin de 500 mg