

04 SEP 1990

PROSPECTO INTERNO  
PARA INCLUIR EN EL ENVASE  
DE VENTA AL PÚBLICO

## PERMETRINA LOCION CREMOSA 1%

### PROSPECTO INTERNO

Loción cremosa para la prevención y terapia de la pediculosis

#### INDICACIONES

- Pediculosis de la cabeza y del cuerpo.

#### CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad conocida a la permetrina o a otras piretrinas o piretroides sintéticos.
- Hipersensibilidad a crisantemos

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- En caso de presentarse hipersensibilidad, interrumpir el tratamiento.
- La permetrina puede exacerbar temporalmente el prurito, edema y eritema producido por la pediculosis misma.
- Debe evitarse el contacto con los ojos. De ocurrir, lavarlos de inmediato profusamente con agua.
- Terminada la aplicación, deshacerse de todo resto de crema para prevenir su ingestión accidental por parte de los niños.
- Embarazo: Usar solamente cuando esté establecida claramente su necesidad.
- Lactancia: Dejar de amamantar durante el uso.
- Uso pediátrico: No ha sido establecida la seguridad de uso de permetrina en niños menores de 2 años.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA  
Departamento de Control de Medicamentos  
Sección Registro de Especialidades Farmacéuticas

#### REACCIONES ADVERSAS

La más frecuente reacción adversa, el prurito, generalmente originado por la infestación misma, puede ser temporalmente exacerbado por el tratamiento.

Con poca frecuencia se presentan picazón y ardor leve y transitorio además de otros signos de irritación, incluyendo eritema, rash y falta de sensibilidad del cuero cabelludo.

FOLLETO PARA INFORMACION  
MEDICINA  
LACION  
VENTA AL POR MAYOR

- tión accidental por parte de los niños.
- Embarazo: Usar solamente cuando esté establecida claramente su necesidad.
- Lactancia: Dejar de amamantar durante el uso.
- Uso pediátrico: No ha sido establecida la seguridad de uso de permetrina en niños menores de 2 años.
- Se recomienda remover las liendres con ayuda de una peineta adecuada.

3- SEP 1991

REACCIONES ADVERSAS

La más frecuente reacción adversa, el prurito, generalmente originado por la infestación misma, puede ser temporalmente exacerbado por el tratamiento.

Con poca frecuencia se presentan picazón y ardor leve y transitorio además de otros signos de irritación, incluyendo eritema, rash y falta de sensibilidad del cuero cabelludo.

VIA DE ADMINISTRACION Y POSOLOGIA

La Loción de Permetrina se aplica por una sola vez. Menos del 1% de los pacientes requieren tratamiento adicional. Si luego de 7 días se observan piojos puede aplicarse un segundo tratamiento.

Lavar con champú, enjuagar y secar el pelo y el cuero cabelludo. Aplicar la Loción Cremosa de Permetrina mediante un masaje firme. Dejar que la loción permanezca 10 minutos en contacto con el pelo y el cuero cabelludo. Luego enjuagar y secar con una toalla limpia.

Luego del tratamiento permanece en el pelo una cantidad residual de permetrina que confiere protección contra una reinfestación por aproximadamente 2 semanas.

PRESENTACION

Envase con 60 ml de loción cremosa.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA  
Departamento de Control de Alimentos y Medicamentos  
Calle 14 de Julio 11-1101, Montevideo