

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE
NOLAIS SHAMPOO 1%

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición y presentación.

Cada 100 mL de shampoo contiene:

Permetrina 1 g

Excipientes: Acido acético glacial, trietanolamina lauril sulfato (Texapon T-42), emulsión de copolímero de acrilatos (Carbopol Aqua), hidróxido de sodio, acido cítrico anhidro, glicerol, cloruro de sodio, esencia pineapple, agua purificada.

Frasco con X mL de shampoo.

Clasificación:

Pediculicida.

Pediculosis:

La pediculosis del cuero cabelludo es una enfermedad causada por un parásito (pediculus humanus capitis). La pediculosis puede afectar la cabeza (incluyendo cejas y barba), el cuerpo o la zona genital del pubis (ladillas). La pediculosis no tratada puede provocar dermatitis (irritación a la piel) y posteriormente una infección secundaria.

Indicaciones.

Está indicado para el tratamiento de la pediculosis del cuero cabelludo.

Contraindicaciones.

No usar en pacientes con antecedentes de alergia a la Permetrina o a la decametrina. También en caso de presentar heridas o inflamaciones en el cuero cabelludo. No usar en niños menores de 2 años.

Advertencias y precauciones.

Se debe evitar el contacto con los ojos y la boca durante la aplicación. Si lo anterior ocurre, se debe enjuagar el área con abundante agua. Mantener este producto estrictamente fuera del alcance de los niños. No ingerir. Mantener en un lugar fresco, a no más de 25°C. Si a los 7 días luego del tratamiento inicial se observaran piojos vivos, se debe hacer una segunda aplicación. Si aparecen síntomas de reacción alérgica al medicamento (prurito, eritema, edema) o síntomas de irritación, es necesario suspender el tratamiento y acudir a un médico. Este producto no debe ser ingerido. En caso de ingestión accidental acudir a un servicio médico de urgencia.

Embarazadas y madres en período de lactancia: Úsese con precaución y con consejo médico.

DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL

Nº Ref:

SECCION REGISTRO

OCT 2004

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA
Departamento de Control Nacional
Registro Nº.....

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones), por lo que no es conveniente la aplicación de este producto junto a otras lociones o cremas o con medicamentos.

Efectos adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. Otros efectos que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante, si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico, entre estos: picazón, aparición de ronchas, inflamación o irritación.

Modo de empleo:

Agite bien el frasco antes de usar. Humedecer el cabello y aplicar suficiente cantidad de shampoo sobre el cabello y el cuero cabelludo, friccionando ligeramente, prestando atención a la zona posterior de la cabeza y cercana a la orejas. Durante el friccionamiento los ojos se deben mantener cerrados y bien tapados en los niños, para evitar que entren en contacto con el preparado. Dejar en contacto durante 10 minutos antes de enjuagar con agua tibia. Secar el cabello y remover los parásitos y liendres con el peine fino. No lavarse la cabeza con shampoo cosmético hasta 24 horas después de la aplicación de este producto para no anular su efecto residual. Como prevención, repetir el tratamiento a los 7 días. Importante: El tratamiento debe realizarse en todo el grupo familiar, aunque aparentemente no esté infestado. Hervir vestimentas y ropa de cama o planchar si no pudiera hervirse.

Condiciones de almacenamiento.

Mantener lejos del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor (a menos de 25°C), luz y humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Medidas de prevención.

Con el objeto de evitar la aparición de la pediculosis (piojos) o su reinfestación es fundamental que usted y su grupo familiar respeten las siguientes recomendaciones: Evitar el contacto físico con personas infestadas. Mantener el pelo amarrado o recogido. Lavar frecuentemente el cabello (mínimo 2 veces por semana); ojalá mantenerlo corto y usar un peine de dientes finos. Evitar el intercambio o uso de gorros, peinetas, cepillos, colet y otros, por el riesgo de pertenecer a personas infestadas, especialmente en colegios. Lavar frecuentemente los utensilios personales, especialmente si se ha diagnosticado pediculosis. El lavado puede hacerse con agua caliente o fría. Ventilar diariamente las habitaciones, asolear frazadas, cobertores y similares. Lavar con frecuencia las sábanas, toallas y ropa de dormir. Revisar habitualmente el cabello (una vez a la semana) de los miembros del grupo familiar que se encuentren en mayor riesgo de contagio (niños en edad preescolar y escolar).

Fabricado por Laboratorio Valma Ltda., Miguel de Atero 2883, Santiago
Distribuido por MED-CELL S.A.
Caupolicán 9261 A-B, Quilicura, Santiago.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE