

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**CLODAVAN****SOLUCIÓN TÓPICA 0.05%****(CLOBETASOL PROPIONATO)**

CLODAVAN

SOLUCIÓN TÓPICA 0,05%

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución tópica contiene:

Clobetasol propionato 0,05 g

Excipientes c.s.: Alcohol isopropílico, Propilenglicol, Povidona, Hidróxido de sodio, Agua purificada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

USO TÓPICO.

USO ADULTO/PEDIÁTRICO**CLASIFICACIÓN**

Corticoesteroide con acción antiinflamatoria, antiprurítica y propiedades vasoconstrictoras.

Código ATC: D07AD01.

Grupo Terapéutico: Corticosteroides muy potentes (Grupo IV).

INDICACIONES

Tratamiento a corto plazo de dermatosis del cuero cabelludo sensibles a esteroides, como psoriasis o ecZema recalcitrante, que no responden a corticoides menos activos.

DOSIFICACIÓN

Vía de administración tópica. Aplicar una pequeña cantidad sobre el área afectada, 1 o 2 veces por día. Por la elevada actividad tópica de las preparaciones de clobetasol propionato, el tratamiento deberá suspenderse cuando el cuadro esté controlado. Se recomienda no usar por más de 2 semanas, pero si se impone un tratamiento más prolongado, debiera apelarse a un corticosteroide menos activo y reservar el clobetasol propionato para el control de las exacerbaciones agudas.

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados)

En forma ocasional pueden presentarse reacciones locales: sensación de calor, prurito, irritación, sequedad, foliculitis, hipertrichosis, erupciones acneiformes, hipopigmentación, dermatitis perioral, dermatitis alérgica por contacto, maceración de la piel, infección secundaria, atrofia de la piel, estrías y fisuras cutáneas.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la loción y a otros corticoides. No administrar en la rosácea, el acné y las dermatitis periorales. Infecciones fúngicas o virales de la piel.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Debido a su absorción sistémica y su notable potencia puede causar, en algunos pacientes, supresión reversible del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, manifestaciones del síndrome Cushing, hiperglicemia y glucosuria; estos efectos se han observado con dosis tan bajas como 2 g de crema (0,5 mg de clobetasol propionato por gramo de crema) por día. La aplicación prolongada, en áreas amplias, y los vendajes oclusivos favorecen la absorción sistémica de los corticoides tópicos. Se recomienda no aplicar clobetasol propionato en niños de menos de 12 años. Los vendajes oclusivos deben evitarse al utilizar preparados que contengan clobetasol propionato. Se recomienda no usar en mujeres embarazadas, a menos que el beneficio para la madre supere el riesgo potencial para el feto (el clobetasol propionato es teratogénico en animales); en caso de hacerlo, el tratamiento debe durar poco y limitarse a áreas pequeñas de piel. El amamantamiento debe suspenderse si se decide administrar clobetasol propionato a la mujer que amamanta.

SOBREDOSIS

Supresión reversible del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal.

CUIDADOS DE ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original, en lugar fresco y seco a no más de 25 °C.